

検査内容変更のお知らせ

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、この度、下記のとおり検査内容を変更させていただくことになりましたので、ご案内申し上げます。

敬白

記

■変更日 令和8年3月31日（火）受付分より

■変更内容

検査項目	変更箇所	新	旧	変更理由	検査案内掲載頁
7327 コレステロール分画	所要日数	3～7日	3～5日	所要日数の変更	p41
新 7578 オステオカルシン ^注	項目コード	7578	7628	検査方法の見直し	p78
	検査方法	ECLIA	FEIA		
	検体量	血清 0.4mL	血清 0.3mL		
	保存法 (安定性)	冷凍 (12週)	冷凍 (4週)		
	基準範囲	ng/mL M 8.4～33.1 F(閉経前)7.8～30.8 (閉経後)142～54.8	8.3～32.7ng/mL		
	報告上限値	9999.9 以上 ng/mL	最終値報告		
1日目 2638 2日目 2641 便中ヘモグロビン及び トランスフェリン	検査方法	金コロイド凝集法	金コロイド法		未掲載
1895 男性AIRS	報告書	E-アイルイス 「AIRS報告書」のルビを削除。 報告書の右下版発行年月を追加。		報告書の見直し	未掲載
1906 女性AIRS					

注) 溶血検体は赤血球に含まれるプロテアーゼにより分解されるため、使用しないで下さい。ピオチンを1日5mg以上投与・摂取している患者からの採血は、投与後、少なくとも8時間以上経過してから実施して下さい。
以上

※お問合せ先：029-837-2721 総合インフォメーション



Android用



iOS用

総合検査案内アプリは
こちらから

2026-A-005